

Périodes de frai des poissons suisses

Espèce	Période principale et secondaire (mois)	Temp. de l'eau	Substrat de ponte	Bon à savoir
 Chevaine (<i>Squalius sp.</i>)	J F M A M J J A S O N D	> 14°C	Gravier, plantes aquatiques	Peut frayer plusieurs fois par saison
 Ombre commun (<i>Thymallus thymallus</i>)	J F M A M J J A S O N D	4-8°C	Gravier aéré	La femelle enfonce les œufs dans les interstices
 Brème franche (<i>Abramis brama</i>)	J F M A M J J A S O N D	> 15°C	Plantes aquatiques, pierres	Le mâle se couvre de boutons nuptiaux
 Barbeau (<i>Barbus barbus</i>)	J F M A M J J A S O N D	14-16°C	Gravier aéré	Migrations nuptiales sur de longues distances
 Perche commune (<i>Perca fluviatilis</i>)	J F M A M J J A S O N D	ab 6°C	Supports immergés	La femelle enroule des cordons d'œufs autour des supports
 Corégones* (<i>Coregonus sp.</i>)	J F M A M J J A S O N D	Dépend des espèces	Divers	Fraie des hauts-fonds jusqu'à plus de 150m de profondeur
 Truites** (<i>Salmo sp.</i>)	J F M A M J J A S O N D	Dépend des milieux	Gravier aéré	La femelle enfouit les œufs dans le gravier
 Brochet (<i>Esox sp.</i>)	J F M A M J J A S O N D	> 5°C	Plantes aquatiques	Les œufs se collent aux plantes aquatiques
 Carpe (<i>Cyprinus carpio</i>)	J F M A M J J A S O N D	> 18°C	Plantes aquatiques	Les œufs se collent aux plantes aquatiques
 Tanche (<i>Tinca tinca</i>)	J F M A M J J A S O N D	> 19°C	Plantes aquatiques	La femelle laisse tomber les œufs sur la végétation
 Omble chevalier (<i>Salvelinus umbla</i>)	J F M A M J J A S O N D	< 10°	Gravier, éboulis	Fraie jusqu'à 130 m de profondeur
 Lotte (<i>Lota lota</i>)	J F M A M J J A S O N D	< 6°C	Sable, vase	Jusqu'à 20 mâles et femelles s'entremêlent
 Silure (<i>Silurus glanis</i>)	J F M A M J J A S O N D	env. 20°C	Vase, plantes aquatiques	Le mâle bâtit et défend le nid
 Sandre (<i>Sander lucioperca</i>)	J F M A M J J A S O N D	10-14°C	Sable, gravier	Le mâle bâtit et défend le nid

Source: Kottelat, M. and J. Freyhof. 2007, Handbook of European freshwater fishes. Photos: Michel Roggo
Périodes de frai des espèces souvent pêchées en Suisse. Le sandre n'est pas considéré comme autochtone.

*Diverses espèces de corégones (au moins 24 en Suisse!) fraient à différents moments et de différentes manières.

** Les six espèces de truites présentes en Suisse ont toutes des périodes de frai similaires

FIBER, Bureau suisse de conseil pour la pêche
Eawag, Seestrasse 79, CH-6047 Kastanienbaum
Téléphone +41 58 765 2171, fiber@eawag.ch
www.conseil-suisse-peche.ch

