LA FRAIE (PONTE)

Les truites de rivière et de lac frayent d'octobre à janvier dans les ruisseaux et rivières comportant des fonds de graviers. Avant et après la dépose des œufs, la femelle se positionne sur le côté, un flanc orienté vers le fond de la rivière et, par de grands battements de sa nageoire caudale, elle soulève les graviers afin de recouvrir les œufs. Enfouis dans la pénombre des interstices des graviers, les œufs sont protégés des prédateurs et le risque est ainsi moindre qu'ils soient dispersés par une crue.

Photo: André Indergand, Erstfeld

Source: Fédération Suisse de Pêche FSP, www.sfv-fsp.ch
et Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche, www.fischereiberatung.ch

A L'INTERIEUR DU LIT DE GRAVIERS

Après que les œufs se soient développés durant plusieurs mois à l'intérieur des graviers, les larves éclosent au printemps. Les espaces entre les graviers servent aussi de pouponnière aux larves de truite fraîchement écloses. Afin que les œufs et les larves soient constamment et suffisamment pourvus en oxygène, les graviers doivrnt être meuble et bien traversés par le courant. Si le lit de la rivière est trop fortement colmaté, les œufs se développent mal ou meurent.

Photos: Michel Roggo

Source: Fédération Suisse de Pêche FSP, www.sfv-fsp.ch
et Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche, www.fischereiberatung.ch

L'ABANDON DU LIT DE GRAVIERS

Peu avant d'avoir épuisé leur sac vitellin, les larves de truites se hissent hors de leur lit de gravier et commencent la recherche active de nourriture. Dès ce stade, les jeunes poissons occupent un territoire qu'ils défendent contre leurs semblables. Selon leur densité il n'y a pas assez de territoires appropriés pour toutes les larves peu après leur éclosion du lit de graviers et l'on observe alors une grande mortalité. Cet aspect est d'importance car ainsi ne survivent que les jeunes poissons adaptés à leurs conditions de vie prédominantes.



Photo: Michel Roggo

Source: Fédération Suisse de Pêche FSP, www.sfv-fsp.ch
et Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche, www.fischereiberatung.ch

LES ŒUFS ET LES LARVES DEMEURENT DANS LE LIT DE GRAVIERS PENDANT ENVIRON 6 MOIS

La durée de développement est dépendante de la température et donc différente selon les cours d'eau.

Source: Fédération Suisse de Pêche FSP, www.sfv-fsp.ch
et Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche, www.fischereiberatung.ch